

**RESULTADOS:**

**Inquérito entre Homens que fazem Sexo com Homens, Moçambique 2011**

O Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV e SIDA 2010 – 2014 (PEN III) reconhece os **Homens que fazem Sexo com Homens (HSH)** como um grupo prioritário para intervenções para prevenir o HIV, pela sua elevada vulnerabilidade à infecção pelo HIV.

De Junho a Novembro de 2011 foi realizado o **inquérito biológico e comportamental (IBBS)** entre HSH em Maputo, Beira e Nampula/Nacala. Este foi o primeiro inquérito deste tipo, feito em Moçambique, para saber quantos HSH tinham o HIV, se tinham acesso e usavam os programas e cuidados de saúde para os HSH nos três locais.

Só podiam participar no inquérito:


- Homens com 18 ou mais anos de idade;
- Que tiveram sexo oral ou anal com um outro homem nos 12 meses antes do inquérito; e
- Que viviam, conviviam ou trabalhavam numa das três áreas do inquérito.

Participaram no inquérito 496 HSH em Maputo, 583 na Beira e 353 em Nampula/Nacala.

**Testagem de HIV antes do inquérito**

Entre os HSH, 47.9% em Maputo, 38.1% na Beira e 54.5% em Nampula/Nacala nunca fez o teste de HIV.

**Figura 6:** Percentagem de HSH que nunca fez o teste de HIV nas três áreas urbanas do IBBS-HSH 2011




**Discriminação e violência contra os HSH**

Nos 12 meses antes do inquérito 5.2% dos HSH em Maputo, 8.0% na Beira e 8.1% em Nampula/Nacala foi discriminado por serem HSH. No mesmo período 2.6% dos HSH em Maputo, 3.0% na Beira e 2.1% em Nampula/Nacala sofreu de agressão física por serem HSH enquanto que 1.0% em Maputo, 1.8% na Beira e 1.4% em Nampula/Nacala foi vítima de violação sexual.

**Estimativa do tamanho da população**

O inquérito estimou que em 2011, em cada 100 homens adultos em Maputo e na Beira, 2 eram HSH. Em Nampula/Nacala, em cada 100 homens adultos, 1 era HSH.

**Figura 7:** Estimativa do tamanho da população de HSH nas três áreas urbanas do IBBS-HSH 2011



**Recomendações**

- Devido ao alto nível de HIV e a baixa percentagem de testagem para o HIV entre os HSH, é urgente aumentar programas de testagem para os HSH;
- Ainda há HSH que não usam o preservativo nas relações sexuais com os seus parceiros e parceiras. Por isso, programas deviam mobilizar os HSH a usarem o preservativo em todas as relações sexuais, com outros homens e com as mulheres.
- O inquérito mostrou que uma parte importante dos homens adultos tem relações sexuais com outros homens. Também mostrou que uma parte importante dos HSH tem HIV. Por isso, ao planificar os cuidados de saúde e para compreender melhor o HIV em Moçambique é preciso tomar em conta os HSH.


*Este inquérito foi financiado em parte pelo Plano de Emergência do Presidente dos EUA para o Alívio do SIDA (PEPFAR), através do Departamento de Saúde e Serviços Humanos e Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos EUA pelo Acordo Cooperativo U2GPS001468. Os resultados e conclusões deste folheto são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente a posição oficial do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos EUA.*



## Prevalência de HIV

A prevalência de HIV foi estimada em 8.2% em Maputo, isto quer dizer que em cada 100 HSH em Maputo, 8 eram HIV-positivo em 2011. Na Beira a prevalência foi de 9.1% e em Nampula/Nacala a prevalência foi de 3.7%.


**Figura 1:** Prevalência de HIV entre os HSH nas três áreas urbanas do IBBS-HSH 2011



### HIV por faixa etária

A prevalência de HIV foi mais elevada entre os HSH adultos com 25 ou mais anos de idade do que entre os HSH jovens com 18-24 anos de idade. Em Maputo 33.8% dos HSH com 25 ou mais anos eram HIV-positivos, enquanto que 2.4% dos HSH com 18-24 anos eram HIV-positivos. Na Beira 32.1% dos HSH com 25 ou mais anos eram HIV-positivos e 2.8% dos HSH com 18-24 anos eram HIV-positivos. Em Nampula/Nacala 10.3% dos HSH com 25 ou mais anos eram HIV-positivos e 2.7% dos HSH com 18-24 anos eram HIV-positivos.

**Figura 2:** Prevalência de HIV por faixa etária entre os HSH nas três áreas urbanas do IBBS-HSH 2011



## Dados sobre comportamentos e riscos


### Sexo com mulheres

Entre os HSH 75.8% em Maputo, 43.8% na Beira e 65.3% em Nampula/Nacala fizeram sexo anal ou vaginal com mulheres nos 12 meses antes do inquérito. Uma parte dos HSH teve 3 ou mais parceiras sexuais nos 12 meses antes do inquérito: 22.2% em Maputo, 9.4% na Beira e 17.1% em Nampula/Nacala.

### Uso do preservativo com último parceiro

Nos 12 meses antes do inquérito, 24.0% dos HSH de Maputo, 19.7% da Beira e 38.1% de Nampula/Nacala não usaram o preservativo na última vez que fizeram sexo anal com outro homem e 33.4% em Maputo, 32.3% na Beira e 50.3% em Nampula/Nacala não usaram o preservativo na última vez que fizeram sexo com uma mulher.


**Figura 3:** Percentagem de HSH que não usou o preservativo com o último parceiro (homem) nas três áreas urbanas do IBBS-HSH 2011



### Contacto com activistas e educadores de pares de HIV

A maior parte dos HSH em Maputo (82.7%), Beira (77.7%) e Nampula/Nacala (65.7%), não teve contacto com educadores de pares ou activistas de HIV nos 12 meses antes do inquérito.


**Figura 4:** Percentagem de HSH que não teve contacto com educadores de pares ou activistas de HIV nas três áreas urbanas do IBBS-HSH 2011



### Sexo transaccional com homens e mulheres

Entre os HSH 6.7% em Maputo, 14.0% na Beira e 14.6% em Nampula ofereceram dinheiro, bens ou serviços em troca de sexo com um homem nos 12 meses antes do inquérito. Também, 18.9% dos HSH em Maputo, 9.2% na Beira, e 23.9% em Nampula/Nacala ofereceram dinheiro, bens ou serviços em troca de sexo com uma mulher no mesmo período.

**Figura 5:** Percentagem de HSH que ofereceu dinheiro, bens ou serviços em troca de sexo com outro homem nas três áreas urbanas do IBBS-HSH 2011



### Conhecimento sobre a transmissão e prevenção do HIV

Em Maputo 54.8% dos HSH, na Beira 52.8% e em Nampula/Nacala 44.3% sabiam bem como se transmite ou se pode evitar apanhar o HIV.