

Tuberculose e Infecções Sexuais

Os Mineiros Activos e a Tuberculose

Mais ou menos 1 em cada 20 mineiros teve tuberculose alguma vez na vida.

Figura 8: Tuberculose entre Mineiros Activos, Moçambique 2012



Os Mineiros Activos e Infecções Sexuais

Mais ou menos 1 em cada 10 mineiros teve um sinal ou alguém lhe disse que tinha uma infecção sexual nos 12 meses antes do estudo.

Figura 9: Infecção Sexual entre Mineiros Activos, Moçambique 2012




Recomendações

- A percentagem elevada de mineiros activos com HIV chama atenção para pensar nos mineiros durante a planificação de serviços de saúde em Moçambique e na África do Sul;
- Há necessidade de melhorar os programas e acções para que os mineiros usem o preservativo em todas as relações sexuais, principalmente com as parceiras ocasionais e as parceiras a quem pagam para ter sexo.

Endereçamos agradecimentos à Associação de Mineiros Moçambicanos (AMIMO), Comissão para a Reinserção dos Trabalhadores das Minas da África do Sul (CRTMAS) e TEBA, Ltd pelo apoio na preparação e implementação do inquérito.

Este inquérito foi financiado pelo Plano de Emergência do Presidente dos EUA para o Alívio do SIDA (PEPFAR), através do Departamento de Saúde e Serviços Humanos e os Centros de Prevenção e Controle de Doenças dos EUA (CDC) pelo Acordo de Cooperação U2GPS001468. Os resultados e conclusões deste folheto são da responsabilidade dos autores e não representam necessariamente a posição oficial do CDC.



Resultados: Estudo Sobre a Saúde dos Mineiros


Os trabalhadores moçambicanos das minas da África do Sul (mineiros) são um grupo importante para os programas de prevenção e tratamento de HIV.

Estes são resultados do estudo feito em Ressano Garcia, de Fevereiro a Maio de 2012, onde participaram 432 mineiros activos. Podiam participar todos os mineiros moçambicanos que estavam a assinar um contrato de trabalho na fronteira de Ressano Garcia para trabalhar numa mina afiliada, e que já tinham trabalhado pelo menos um ano na África do Sul.

O HIV em Mineiros Activos


Mais ou menos 1 em cada 5 mineiros activos têm HIV (22.3%).

Figura 1: O HIV em Mineiros Activos, Moçambique 2012



Dos 432 mineiros que participaram 97% foram de Maputo, Gaza e Inhambane. Os mineiros activos das províncias de Gaza e de Maputo têm mais risco de ter HIV do que os mineiros na província de Inhambane.

Figura 2: O HIV em Mineiros Activos por Província, Moçambique, 2012




Os mineiros activos com 31 a 40 anos de idade têm mais risco de ter HIV do que os mineiros activos de outras idades. E tem um risco quase 2 vezes maior que os mineiros activos com 30 anos de idade ou menos (26.7% vs. 13.6%).

Os Mineiros Activos e o Teste de HIV


Mais ou menos 9 em cada 10 mineiros já fizeram o teste de HIV pelo menos uma vez na vida.

Figura 3: Testagem de HIV antes do Estudo entre os Mineiros Activos, Moçambique 2012



Mais ou menos 3 em cada 4 mineiros activos que têm o HIV não sabem disso.

Figura 4: Mineiros Activos que não Sabem que têm HIV, Moçambique 2012



Riscos para ter HIV

Os Mineiros Activos e Múltiplas Parceiras Sexuais

Mais ou menos 1 em cada 5 mineiros activos tiveram sexo com 3 ou mais mulheres diferentes nos 12 meses antes do estudo.


Figura 5: Mineiros Activos com 3 ou Mais Parceiras Sexuais, Moçambique 2012



Os Mineiros Activos e o Uso do Preservativo

Apenas 1 em 5 mineiros activos usou o preservativo na última vez que teve sexo com a sua parceira estável ou sua esposa.

Figura 6: Uso do Preservativo pelos Mineiros Activos com Parceiras Sexuais Estáveis ou Esposas, Moçambique 2012



Apenas 3 em cada 5 mineiros activos usaram o preservativo na última vez que tiveram sexo com uma parceira ocasional ou a quem deram dinheiro em troca de sexo.

Figura 7: Uso do Preservativo com Parceiras Sexuais Ocasionais ou Pagas entre Mineiros Activos, Moçambique 2012

